Segregacja medyczna i ocena kliniczna podejrzanych i potwierdzonych przypadków małpiej ospy

Każdy podejrzany przypadek powinien zostać poddany ocenie klinicznej pod kątem ciężkości i czynników ryzyka przed podjęciem decyzji o przyjęciu do placówki służby zdrowia lub skierowaniu do opieki domowej. Decyzja ta powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku przez personel kliniczny.

A B C D E ocena[1]



A

Drogi oddechowe: sprawdź pacjenta pod kątem objawów niedrożności, odgłosów



B

Oddychanie: częstość oddechów częstotliwość, głębokość, mięśnie pomocnicze, rozszerzenie nozdrzy, symetria, SpO_2



C

Krążenie: puls, ciśnienie krwi, CRT, wydalanie moczu



D

Niepełnosprawność: AVPU, poziom glukozy we krwi, drgawki



E

Ekspozycja i historia przyjmowanie

Jakie są objawy powikłań małpiej ospy?

1. **Gorączka:** niekontrolowana lub utrzymująca się gorączka.
2. **Ból:** niekontrolowany lub uporczywy ból.
3. **Wtórne zakażenie skóry:** silne zaczerwienienie, tkliwość, ropa lub dalsze rozprzestrzenianie się zmian chorobowych mpox.
4. **Zmiany na błonie śluzowej:** rozległe zmiany na błonie śluzowej (odbytniczej, narządów płciowych, jamy ustnej) utrudniające funkcjonowanie, np. trudności w połykaniu, ból podczas oddawania moczu lub wypróżniania.
5. **Nudności** i/lub **wymioty:** niekontrolowane lub uporczywe.
6. **Ograniczone spożycie pokarmów:** odwodnienie i objawy niedożywienia.
7. **Trudności w oddychaniu:** przyspieszony oddech.
8. **Obrzęk szyi:** trudności w połykaniu lub oddychaniu.
9. **Wstrząs:** słaby puls, słabe ukrwienie, zmniejszona ilość oddawanego moczu, przyspieszony oddech, zaburzenia świadomości, niedociśnienie.
10. **Oko:** zaburzenia widzenia, ból lub zaczerwienienie oka.
11. **Choroby** współistniejące w stanie dekompensacji, w tym choroby płuc, nerek, serca, wątroby, skóry, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia zdrowia psychicznego lub anemia sierpowata.

TAK

- Przyjąć pacjenta do oddziału izolacyjnego placówki służby zdrowia.
- Zapewnienie leczenia objawowego, w tym leczenia bólu, odżywiania, pielęgnacji skóry i oczu, jeśli to konieczne.
- Zapewnienie optymalnej opieki wspomagającej.

NIE

- Preferowana izolacja w placówce służby zdrowia i wczesna opieka w przypadku powikłań.
- Jeśli nie jest to możliwe, można rozważyć opiekę domową, jeśli spełnione są odpowiednie kryteria. [2]

Grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby:

- Dzieci poniżej 5 roku życia.
- Kobiety w ciąży.
- Osoby z obniżoną odpornością, np. osoby zakażone wirusem HIV (szczególnie z liczbą komórek CD4 poniżej 200)[3] .

[1] Podstawowa opieka w nagłych wypadkach. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/275635).

[2] Zapobieganie i kontrola zakażeń oraz środki dotyczące wody, warunków sanitarnych i higieny w opiece domowej i izolacji w przypadku małpiej ospy w warunkach ograniczonych zasobów: tymczasowy przewodnik operacyjny. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia; 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/379477).

[3] Skonsolidowane wytyczne dotyczące usług w zakresie testów na HIV. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia; 2019 (https://iris.who.int/handle/10665/336323).

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.who.int/teams/health-care-readiness/clinical-management-of-monkeypox

World Health Organization